

【向精神薬処方数制限】睡眠薬：2剤、抗不安薬：2剤、抗うつ剤：3剤、抗精神病薬：3剤

★超過するとH26.10から処方箋料、処方料、薬剤料が大幅に査定されます。

向精神薬 一覧【催眠鎮静剤・抗不安剤】

薬効分類	分類	効果	院外のみ：○	薬剤名	推奨度	作用時間	(参考)半減期	添付文書適応症					
								不眠症	心身症・神経症	左記に伴う睡眠障害	(抑)うつ		
112 催眠鎮静剤・抗不安剤	睡眠薬	入眠薬	○	アモバン錠「7.5mg」	◎	超短	4	○					
			○	アモバン錠10mg	◎	超短	4	○					
				トリアゾラム0.125mg (30日制限)		超短	2~4	○					
			○	ハルシオン錠0.25mg(30日制限)		超短	2~4	○					
			○	マイスリー錠「10mg」30日限度	◎	超短	2	○					
			○	マイスリー錠5mg30日限度		超短	2	○					
			○	ロゼレム錠8mg	◎	超短	1	○					
	中途覚醒・早朝覚醒	若年成人	○	グッドミン0.25mg(レドミン後発 30日限)		短	7	○					
				リスミー錠2mg		短	10	○					
			○	ロラメット錠1mg		短	10	○					
			○	ユーロジン「2mg」錠 (30日制限)		中間	24	○					
			○	ネルボン錠、ベンザリン錠5mg		中間	28	○					
			○	ユーロジン1mg錠 (30日制限)		中間	24	○					
			○	ロヒプノール錠、サイレース錠1mg (30日制限)		中間	7	○					
			○	ロヒプノール錠2mg (30日制限)		中間	7	○					
○			ドラール錠15mg (30日制限)	高齢者	長	36	○						
○			ゾメリン錠10mg(30日制限)		長	42~123	○						
軽	検査用	○	フェノバル散10%(100mg/g)	すすめない	長		○	○					
			フェノバル錠30mg		長		○	○					
			トリクロリールシロップ10% 要発注		長		○						
		○	グランダキシ錠50		超短			○					
中	長	○	リーゼ錠5mg (30日制限)		短	6.3		○	○	○			
			ソラナックス0.4mg錠(30日制限)		短	14		○	○	○			
		○	アタラックス-Pカプセル25mg		長		1.2		○	○	○		
			セディール錠10mg		長	27~28	*1	○	*1	○	○		
		○	セルシン錠「2mg」(90日制限)		長	27~28	*1	○	*1	○	○		
		○	セルシン錠5mg(90日制限)		長	27~28	*1	○	*1	○	○		
		○	メイラックス錠「1mg」(30日制限)		長	122		○	○				
		○	メイラックス錠2mg(30日制限)		長	122		○	○				
		強	短	○	デバス錠「0.5mg」		短	6		○	○	○	
				○	デバス錠1mg		短	6		○	○	○	
○	ワイパックス錠「0.5mg」				中間	12		○	○	○			
○	ワイパックス錠1mg				中間	12		○	○	○			

*1:麻酔前投薬の適応あり

向精神薬 一覧【精神神経用剤】

薬効分類	機能	分類	院外のみ：○	薬剤名	半減期	CP換算	添付文書適応症						
							左記に伴う不眠症	神経症	(抑)うつ	統合失調症	躁症状		
117 精神神経用剤	抗うつ薬	三環系	一代	○	トフラニール錠「10mg」	7.6	150			○			
					トリプタノール錠10	15.1	150			○			
				○	アナフラニール錠10mg		120			○			
				○	アナフラニール錠25mg		120			○			
		四環系	二代	○	テトラミド錠10mg	3.6~4.4	60			○			
				○	ルジオミール錠10mg		150			○			
		SSRI	三代	○	ジェイゾロフト錠「25mg」		100			○			
					パキシルCR錠12.5mg		40			○			
					パキシルCR錠25mg		40			○			
					レクサプロ錠10mg		データなし			○			
	SNRI	四世代	○	サインバルタカプセル20mg		データなし			○				
				トレドミン錠「25mg」	8	100			○				
	NaSSA	その他	○	リフレックス錠15mg		データなし			○				
			○	レスリン錠25mg	8	100			○				
	抗精神病薬	定型	低力価	○	ウインタミン細粒(10%) (100mg/g)		100	○	○	○	○	○	
				○	コントミン糖衣錠25mg		100	○	○	○	○	○	
				○	ヒルナミン細粒10%		100				○	○	○
					セレネース錠「0.75mg」		2				○	○	○
					ノバミン錠5mg		15				○	○	○
		非定型	高力価	○	クロフェクト錠25mg	中間型	40			○	○	○	
○				ニューレプチル細粒10%	中間型	20			○	○	○		
SDA				リスベリドン錠1mg(リスパダール後発)		1				○	○	○	
				リスベリドン内用液錠0.5mg 0.5ml		1				○	○	○	
DSS				○	エビリファイ錠3mg		4				○	○	○
MARTA	その他	○	エビリファイ錠6mg		4				○	○	○		
			セロクエル25mg錠		66				○	○	○		
		○	ジブレキサ錠2.5mg		2.5			○	○	○	○		
		○	ジブレキサ錠5mg		2.5			○	○	○	○		
		○	ジブレキササイデイス錠10mg		2.5			○	○	○	○		
232消化性潰瘍用剤	その他	○	ドグマチール錠50mg	中間型	200			○	○	○			

SSRI:セロトニン再取り込み阻害薬 SNRI:セロトニン/ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 NaSSA:ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ薬
SDA:セロトニド/バミン/アンタゴニスト DSS:ドーパミンシステム安定薬 MARTA:多元受容体作用向精神薬

CP換算値:クロロプロマジン換算値(CP100mgと抗精神病効果が等しくなる各薬剤量)
CP換算値の合計が1000mg以上は大量投与。慢性期には減薬も検討。
CP換算値=薬処方量÷等価用量×100
ドパミンを60~80%遮断する量が抗精神病薬の至適要領。これに必要なCP換算値は300~600mgと推測される。初発の場合200mg程度を目安とする。至適用量でも年齢(50歳以上)、抗精神病薬の感受性が高まり錠体外路障害などの有害事象に注意。

*** これらの薬剤服用中は「自動車の運転等を行わない」こととなっています。(場合によっては危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。)**