

## 末梢性 T 細胞リンパ腫(PTCL)での Brentuximab vedotin 療法について(ver2)

### スケジュール

Brentuximab vedotin (アドセトリス®) 1.8mg/kg d.i.v. day1  
21 日毎

支持療法として

Day1:注射 デキサメタゾン

### ガイドライン上の扱い

再発 難治 PTCL 患者での

CD30 陽性の場合の

救済療法の一つ

### 治療効果

再発 難治 未分化大細胞リンパ腫(ALCL)患者における

有効性と安全性をみた

第 II 相試験

N=58

\*PTCL の病型は、PTCL、PTCL-NOS(非特定型)、AITL(血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫)、ALCL からなる。

CR(完全奏効率)	66%
CR になった患者は 16/38 が幹細胞移植を受け	
5 年 OS(全生存率)	79%
5 年 PFS(無増悪生存率)	57%
PR(部分奏効)では OS(全生存期間)中央値	11.6 ヶ月
SD(安定)では OS(全生存期間)中央値	6.9 ヶ月
PD(進行)では OS(全生存期間)中央値	4.2 ヶ月

### 副作用%(Grade3 以上)

末梢神経障害 91%

### 備考

- ・悪性リンパ腫の効果判定：CT,FDG-PET、腫瘍マーカーが用いられる
  - ・血清腫瘍マーカー：LDH・ $\beta$ 2MG・sIL-2R。感度、特異度ともにあまり高くない
- ・Brentuximab vedotin
  - ・中等度・高度肝障害有する患者で、真菌感染症による死亡例が報告されている。
  - ・末梢神経障害 49~59%：grade2 以上では、休業、減量、中止など行う。

	grade1	grade2	grade3	grade4
末梢性感覚ニューロパチー	症状がない	身の回り以外の 日常生活動作の制限	身の回りの 日常生活動作の制限	緊急処置を要する

- ・感染症 13~24% infusion reaction 9~12% 骨髄抑制など発現あり。