

## 進行胆道がんにおける

1<sup>st</sup> line としての

GEM+CDDP +S-1 療法について

### スケジュール

ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	day1
シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	day1
S-1	80mg/m <sup>2</sup>	p.o.	day1~7

14 日毎

\*もともとの GEM+CDDP 療法は day1,8 投与 21 日回しなので、  
GEM、CDDP、S-1 を減量（休薬を多く）して上乗せしてある。

### ガイドライン上の扱い

切除不能胆道がんの 1st line として推奨する（レベル A）

### 治療効果

切除不能 再発 胆道がん患者に対して

1<sup>st</sup> line として

GEM+CDDP+S-1 と GEM+CDDP を比較した

第Ⅲ相試験（KHBO1401 試験）（ESMO2018 での発表）

N=246

GEM+CDDP+S-1 vs GEM+CDDP

OS(全生存期間)中央値 13.5 ヶ月 vs 12.6 ヶ月

PFS(無増悪生存期間)中央値 7.4 ヶ月 vs 5.5 ヶ月

### 副作用%（Grade3 以上）

GEM+CDDP+S-1 vs GEM+CDDP

下痢(24% vs14%)

粘膜炎(28% vs 13%)

皮疹(23% vs 7%)

末梢神経傷害(3% vs 11%)