

**切除不能 悪性胸膜中皮腫患者での
1st line としての
Ipilimumab/nivolumab 療法について**

スケジュール

ipilimumab(ヤーボイ®)	1mg/kg	30min d.i.v.	day1
nivolumab(オプジーボ®)	240mg/body	30min d.i.v.	day1,15,29
	(臨床試験では 3mg/kg)		

42 日毎

ガイドライン上の扱い

進行期 悪性胸膜中皮腫 PS 0-1 の
1st line として推奨する(推奨の強さ 1)

治療効果

切除不能 悪性胸膜中皮腫患者における
1st line での

Ipilimumab/nivolumab 併用療法の、シスプラチン(or カルボプラチン)/ペメトレキセド療法と比較した
第 III 相試験 (Check Mate 743 試験)

N=605

Ipilimumab/nivolumab vs シスプラチン(or カルボプラチン)/ペメトレキセド療法

OS(全生存期間)中央値 18.1 ヶ月 vs 14.1 ヶ月

副作用%(Grade3 以上)

下痢 20.7% (3.3%) 悪心 10.0% (0.3%)

疲労 13.7% (1.0%)

そう痒症 16.3% (1.0%) 発疹 14.3% (1.0%)

甲状腺機能低下 10.7%