

# 卵巣がん患者における 術前補助療法としての DTX+CBDCA+BV 療法について

## スケジュール

ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	day1
カルボプラチン	AUC6	d.i.v.	day1
ベバシズマブ(アバスチン®)	15mg/kg	i.v.	day1

21日毎 3-6 サイクル

支持療法として

Day1:注射デキサメタゾン、グラニセトロン、ファモチジン、クロルフェニラミン 内服アプレピタント

Day2-3:内服アプレピタント、デキサメタゾン

## ガイドライン上の扱い

なし

## 治療効果

切除不能 進行 卵巣がん患者において

DTX or PTX/CBDCA の術前化学療法に

ベバシズマブを上乗せした効果と安全性をみた試験

(Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 57(2018)650-653)

N=24

BV 上乗せケモ後に Interval debulking surgery N=11

ケモ後に Interval bulking surgery N=13

BV 上乗せ vs ケモのみ

Complete resection 率 81.8% vs 69.2%

Complete or optimal resection 率 100% vs 69.2%

## 副作用%(Grade3 以上)

BV 上乗せ vs ケモのみ

好中球減少(63.6% vs 84.6%)

血小板減少(18.1% vs 7.6%)

手術時

輸血 22.2% vs 30.7%

腹部切開ヘルニア 19% vs 0%

## 備考