

再発 治療抵抗性 マントル細胞リンパ腫における R-Bd 療法について

スケジュール

リツキシマブ	375mg/m ²	d.i.v.	day1
ボルテゾミブ(ベルケイド®)	1.3mg/m ²	s.c.	day1,4,8,11
デキサメタゾン(デカドロン®)	40mg/body	p.o.	day1-4

適応の関係でベルケイド®デカドロン®

21 日毎

支持療法として

Day1:内服アセトアミノフェン、クロルフェニラミン

ガイドライン上の扱い

記載なし

治療効果

(リツキシマブとボルテゾミブの相乗効果を期待して)

再発 治療抵抗性 マントル細胞リンパ腫患者での

R-Bd 療法の効果をみた試験(haematologica 2011;96(7):1008-1014)

N=16

奏効率 81.3%

CR(完全奏効率) 43.8%

PFS(無増悪生期間)中央値 12.1 ヶ月

OS(全生存期間)中央値 38.6 ヶ月

副作用%(Grade3 以上)

感覚神経障害 56.3% (12.5%) 倦怠感 43.8% (18.8%)

下痢 31.3% (6.3%) 感染症 43.8% (0%) 皮疹 18.8% (0%)

貧血 81.3% (0%) 血小板減少 100% (37.5%) 白血球減少 37.5% (6.2%)

備考

適応の問題でベルケイド®を使用しているのは、R-Bd と VRCAP