

フェスゴ皮下注について(乳がん)

スケジュール

(初回)フェスゴ IN 8分以上で皮下 21日毎

(2回目以降)フェスゴ MA 5分以上で皮下 21日毎

大腿部の、前面か側面に投与(腹部では吸収が低下)

支持療法なし

当院でのレジメン変更

ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル→フェスゴ+ドセタキセル

(ペルツズマブ+)トラスツズマブ(乳がんアジュバント)→フェスゴ

フェスゴ®について

- ・ペルツズマブ、トラスツズマブ、ボルヒアルロニダーゼを配合した皮下注製剤
 - ペルツズマブ：HER2,HER3 ダイマー形成阻害
 - トラスツズマブ：抗 HER2 抗体
 - ボルヒアルロニダーゼ：薬剤の浸透吸収促進
- ・点滴静注を皮下注にすることで、簡便をねらった製剤

フェスゴ IN(初回用)：ペルツズマブ/トラスツズマブ/ボルヒアルロニダーゼ=1200mg/600mg/30000U

薬価：約 47 万円

フェスゴ MA(維持用量)：ペルツズマブ/トラスツズマブ/ボルヒアルロニダーゼ=600mg/600mg/20000U

薬価：約 27 万円

FeDeriCa 試験(AC→タキサン/ペルツズマブ/トラスツズマブ→手術→ペルツズマブ/トラスツズマブ)

PHranceSCa 試験(ペルツズマブ/トラスツズマブを点滴静注と皮下注でクロスオーバー)

により点滴静注と皮下注の同等性が確認され、承認された