

## HER2 陰性 進行 再発 胃がんでの

### 1<sup>st</sup> line としての

### SOX+Pembro.療法について

#### スケジュール

SOX+Pembro.

ペムブロリズマブ(キイトルーダ®)	200mg/body	d.i.v.	day1
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	day1
S-1	80-120mg/body/day	p.o.	day1~14 21日毎

支持療法として

Day1:注射ホスネツピタント、パロノセトロン、ファモチジン、デキサメタゾン、内服ジフェンヒドラミン

#### ガイドライン上の扱い

日本胃癌学会ガイドライン委員会のコメント「速報」

S-1+オキサリプラチンまたは S-1+シスプラチンとのペムブロリズマブの併用は、弱く推奨される

#### ペムブロリズマブ(キイトルーダ®)について

PDL-1 阻害(がん細胞側)：デュルバルマブ(イミフィンジ®)アテゾリズマブ (テセントリク®)

PD-1 受容体阻害(T細胞側)：ニボルマブ (オプジーボ®)、ペムブロリズマブ (キイトルーダ®)

薬価：キイトルーダ(100) 約 21 万円 200mg で約 42 万円

オプジーボ(240) 約 31 万円 360mg で約 46 万円

#### 治療効果

PDL-1 陽性(CPS $\geq$ 1) HER2 陰性 進行 再発 胃がん患者で

1<sup>st</sup> line での

SOX+Pembro. と SP+Pembro. を比較した

国内第 II 相試験(KEYNOTE-659 試験)

N=100

SOX+Pembro. vs SP+Pembro.

PFS(無増悪生存期間)中央値 9.4 ヶ月 vs 8.3 ヶ月

OS(全生存期間)中央値 16.9 ヶ月 vs 17.1 ヶ月

#### 副作用%(Grade3 以上)

SOX+Pembro. vs SP+Pembro.

末梢神経障害 94.4% vs 26.1%(3.7% vs 0%) 悪心 59.3% vs 60.9% (0% vs 2.2%)

血小板減少 51.9% vs 23.9% (14.8% vs 2.2%) 貧血 16.7% vs 32.6% (5.6% vs 15.2%)

好中球減少 40.7% vs 69.6% (13.0% vs 45.7%) 発熱 13.0% vs 6.5% (1.9% vs 0%)

下痢 38.9% vs 43.5% (3.7% vs 0%) 便秘 18.5% vs 47.8% (0% vs 0%)

倦怠感 37.0% vs 28.3% (0% vs 0%) 味覚不全 35.2% vs 30.4% (0% vs 0%)

口内炎 25.9% vs 32.6% (0% vs 0%) AST 上昇 16.7% vs 15.2% (0% vs 0%)  
血管痛 13.0% vs 2.2% (0% vs 0%) 皮膚色素過剰 5.6% vs 13.0% (0% vs 0%)  
しゃっくり 3.7% vs 15.2% (0% vs 0%)

## 備考