

## CLDN18.2 陽性 HER2 陰性 切除不能 進行 再発 胃がんでの

### 1<sup>st</sup> line としての

### mFOLFOX6+ゾルベツキシマブ療法について

#### スケジュール

mFOLFOX6+ゾルベツキシマブ

|   |                       |             |      |
|---|-----------------------|-------------|------|
| ゾルベツキシマブ(ビロイ®)  | 800mg/ m <sup>2</sup> | d.i.v.      | day1 |
| 2 サイクル以降は 400mg/ m <sup>2</sup> (原法は 600mg/ m <sup>2</sup> を 21 日毎) |                       |             |      |
| L-OHP(オキサリプラチン®)  | 85mg/m <sup>2</sup>   | d.i.v.      | day1 |
| l-LV(アイソボリン®)   | 200mg/m <sup>2</sup>  | d.i.v.      | day1 |
| 5-FU  | 400mg/m <sup>2</sup>  | i.v.        | day1 |
| 5-FU  | 2400mg/m <sup>2</sup> | 46hr d.i.v. | day1 |

14 日毎

支持療法として

Day1:注射ホスネツピタント、パロノセトロン、ファモチジン、デキサメタゾン、内服ジフェンヒドラミン

Day2-3:内服デキサメタゾン

#### ガイドライン上の扱い

日本胃癌学会ガイドライン委員会「速報」

CLDN18.2 陽性かつ HER2 陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌/胃食道部接合部癌に対する、一次治療として、ゾルベツキシマブ+化学療法(mFOLFOX6 もしくは CAPOX)を推奨する

#### 治療効果

CLDN18.2 陽性 HER2 陰性 切除不能 進行 再発 胃がん患者で

1<sup>st</sup> line での

mFOLFOX6 へのゾルベツキシマブの上乗せ効果をみた

第Ⅲ相試験(SPOTLIGHT 試験)

N=565

mFOLFOX6+ゾルベツキシマブ vs mFOLFOX6

PFS(無増悪生存期間)中央値 10.6 ヶ月 vs 8.6 ヶ月

OS(全生存期間)中央値 18.2 ヶ月 vs 15.5 ヶ月

#### 副作用%(Grade3 以上)

mFOLFOX6+ゾルベツキシマブ vs mFOLFOX6

好中球減少 19.4% vs 15.8%(13.6% vs 11.2%) 貧血 14.3% vs 17.3%(3.9% vs 3.2%)

悪心 68.8% vs 37.1%(12.5% vs 2.2%) 嘔吐 57.7% vs 15.1%(12.9% vs 1.4%)

下痢 18.3% vs 16.9%(1.1% vs 0%) 便秘 10.0% vs 9.4%(0.7% vs 0%)

疲労 17.6% vs 20.9%(2.9% vs 2.2%)

Infusion reaction(腹痛、発熱、疲労、高血圧など) 64.2% vs 46.4%(12.9% vs 3.6%)

#### 備考