

Drug Information News

～ 2026年 7月号 ～

熊本総合病院 薬剤部 広報誌 DI室 上淵・濱田・大岡

【CONTENT】

- ✓ 今月のトピックス（薬ではなく「容器」が足りない）
- ✓ 薬事委員会報告ダイジェスト（2026, 6/23開催分）
- ✓ 医薬品・医療機器等 安全性情報 No.429 抜粋
- ✓ Drug Safety Update No.345 抜粋

【中東情勢が引き起こす「軟膏ツボ不足」】

皆さんご承知の通り、近年の中東情勢の緊迫化に伴い、原油由来製品の原料となる「ナフサ」の供給不安が広がっています。その影響は私たち医療現場にも及んでおり、薬剤部でもミキシング等で必要になるゴム手袋をはじめ、患者の内服を用法別にまとめる「一包化」をするための分包紙や印字ロール、さらには軟膏やクリームを混合・分注する際に使用するプラスチック製の「軟膏ツボ」などが問題となっています。

今回は「軟膏ツボ」を例に挙げますが、軟膏ツボの多くはポリプロピレンというプラスチックで作られており、この原料は石油から製造されるため、原油価格の高騰や国際情勢の影響を受けやすい特徴があります。中東地域は世界有数の原油・天然ガスの産出地域であり、日本を含む多くの国がエネルギー資源を輸入しています。近年、この地域では紛争や軍事的緊張が続いており、原油の安定供給に対する懸念が高まっています。特に、中東とアジア・ヨーロッパを結ぶ海上輸送の要衝（「ホルムズ海峡」と言えばピンとくるのではないのでしょうか？）では、船舶の航行リスクが増加し、輸送コストの上昇や物流の遅延も発生しています。その結果、石油を原料とするプラスチック製品の製造コストや供給体制にも影響が及ぶことがあります。

現在、院内でも病棟定置薬としていた30g軟膏ツボ（プロペト、レスタミン軟膏、亜鉛華軟膏）が配置困難な状況になっているため、色々とご迷惑をお掛けしていることと思います。それぞれ代替薬等での対応をお願いしている所ではありますが、何かお困りの点などあれば病棟担当の薬剤師へいつでもご相談下さい。

医療を支えているのは医薬品だけではなく、今回の軟膏ツボ以外にも、注射器、輸液バッグ、シリンジなど、多くの医療資材によって日々の診療は成り立っています。遠く離れた中東で起きている出来事が、病棟や薬局の業務に影響を及ぼす時代、「薬が足りない」だけでなく、「薬を入れる容器も医療資源」であることを、この機会に改めて再認識しなくてははいけませんね。



【新規仮採用申請】

- ・ツカイザ錠50mg, 150mg（ツカチン[®]：ファイザー）2818.4/7317円
【効】化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能または再発乳癌
- ・ロスバスタチン錠2.5mg, 5mg「DSEP」10.8/16.9円
【効】高コレステロール血症など
- ・ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」6.6円
【効】胃・十二指腸・食道における痙攣並びに運動機能亢進など
- ・グリメピリド錠1mg「トワ」10.8円
【効】2型糖尿病
- ・プロペト（白色ワセリン：丸石）3.16円/g
【効】軟膏基剤
- ・ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニゴロ」54924円
【効】がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制

【院外採用申請】

- ・イセルティ錠100mg（リンザゴリクスリン：キッセイ）429.1円
【効】子宮筋腫に基づく症状の改善
- ・アリッサ配合錠（エステロール・ドロスピレノン：富士製薬）180.6円
【効】月経困難症
- ・ビヨントラ錠400mg（アコラジス：アレクシオン）8979円
【効】トランスサイレチン型心アミロイドーシス
- ・ウェリレグ錠40mg（ベルズチファン：MSD）21916.8円
【効】がん化学療法後に増悪した根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
- ・アバレプト懸濁性点眼液0.3%（モツギハトルブ：千寿）577.5円
【効】ドライアイ

【緊急購入申請】

- ・ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒 13.1円/g
【効】月経不順、月経困難、便秘、痔疾
- ・リサイオ点滴静注液100mg 19331円
【効】悪性リンパ腫、小児悪性固形腫瘍

【院内採用削除】

ジーラスタ皮下注3.6mg … 切替変更のため

ロスバスタチン0D錠2.5mg, 5mg「ツイ」、ブスコパン錠10mg、

グリメピリド0D錠1mg「トワ」 … 販売中止のため

* 他、医薬品安全管理のための業務手順書一部改定、有害事象報告（この紙面では省略）

1. 重篤副作用疾患別対応マニュアルについて

医療関係者へ上記マニュアルの活用周知案内

*厚生労働省重篤副作用疾患別対応マニュアルウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iyakuhin/topics/tp061122-1.html

2. 病院及び薬局における医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況等に関する調査結果と望まれる方向について

【医療機関等における医薬品安全性情報の入手・伝達・活用状況に関する調査結果】

<https://www.pmda.go.jp/safety/surveillance-analysis/0010.html>

2026.5

No. 345

厚生労働省 医薬局 監修

URL <https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/001.html>

DRUG SAFETY UPDATE

医薬品安全対策情報

—医療用医薬品注意事項情報改訂のご案内—

*「重要」項目のみ抜粋。詳細に関しては、医薬品医療機器総合機構(PMDA)のHPを確認下さい(この紙面では省略)

*インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」、エンブレル皮下注ペン、エタネルセプトBS皮下注ペン

重大な副作用 追記「自己免疫性肝炎」

*大塚塩カル注、カルチコール注射液

禁忌 削除「ジギタリス製剤(ジゴキシン等)を投与中の患者」

併用禁忌 削除「ジギタリス製剤(ジゴキシン等)」

併用注意 追記「強心配糖体(メチルジゴキシン、ジゴキシン、デスラノシド)」

*バベンチオ点滴静注

重大な副作用 追記「重度の皮膚障害：中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)等の重度の皮膚障害があらわれることがある。また、類天疱瘡があらわれることがあるので、水疱、びらん等が認められた場合には皮膚科医と相談すること。」

*スチバーガ錠

重大な副作用 追記「高アンモニア血症：肝機能異常を伴わずに、高アンモニア血症があらわれることがある。意識障害が認められた場合には、アンモニア値の測定を考慮すること。」